



【キイトルーダ+EG療法について】

(キイトルーダ+エピルビシン+エンドキサン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																						
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15分		1日2錠																				
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服																						
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分																						
エピルビシン注	抗がん剤です	5分																						
エンドキサン注	抗がん剤です	30分																						

この週はお休みです。

この週はお休みです。

尿の色が赤くなることがあります。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

*キイトルーダ注の副作用につきましては別紙を用いてご説明します。



- *注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- *それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- *何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。