



【パクリタキセル+キイトルーダ療法について】



様

コース

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	...		
ファモチジン注	アレルギーを予防する薬です	30分	☺																													
ボラミン注			☺																													
デキサート注			☺																													
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分	☺																													
パクリタキセル注	抗がん剤です	1時間	☺																													

☺ デキサート注には、吐き気止めとしての作用もあります。

*キイトルーダ注は3週間に1回の投与、パクリタキセルは3週連続で投与後、1週お休みのサイクルで繰り返します。

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	...	
自覚症状	過敏症	■							■								■							■						
	食欲不振・吐き気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	筋肉痛・関節痛	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	口内炎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	手足のしびれ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
検査値	白血球減少	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	赤血球減少(貧血)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	血小板減少	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	肝機能低下	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*キイトルーダ注の副作用につきましては別紙を用いてご説明します。



*注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

*上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

*それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

*何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。