



# 【エンハーツ療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
グラニセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15分																							
エンハーツ	抗がん剤です	90分		2回目から投与時間が30分になります。								この週はお休みです。						この週はお休みです。							

## 😊 治療による副作用

   : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状	<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																						<span style="background-color: #00aaff;">  </span>
	食欲不振・吐き気	<span style="background-color: #00aaff;">  </span>	<span style="background-color: #00aaff;">  </span>	<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																				<span style="background-color: #00aaff;">  </span>
	手足のしびれ	<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																						
検査値	白血球減少					<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																		
	血小板減少					<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																		
	肝機能低下					<span style="background-color: #00aaff;">  </span>																		

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)  
間質性肺炎



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。