



# 【アービタックス+FOLFIRI療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			アロキシ注 デキサート注 ポララミン注	吐き気止めとアレルギー様症状を抑える薬です	15分	☺														☺													
デキサート注 ポララミン注	アレルギー様症状を抑える薬です	15分								☺															☺								☺
アービタックス注	抗がん剤です	2時間	☺							☺								☺							☺								☺
イリノテカン注	抗がん剤です	2時間	☺															☺															☺
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です	2時間	☺															☺															☺
5-FU注	抗がん剤です	約5分	☺															☺															☺
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	↔☺↔															↔☺↔															↔☺↔

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

## 😊 治療による副作用

☺ : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
		1/0	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28				
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
自覚症状	アレルギー様症状								☺																									
	食欲不振・吐き気																																	
	口内炎																																	
	下痢																																	
	色素沈着																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。