

【アービタックス療法について】



コース目 ○ セ薬の名前レ治療のスケジ

○ お楽の名	前と治療のスケ	ジュール(副作	用の	状況を	を考慮	貳して、 抗	がん	剤の調	影響カ	が強く	残つて	ている	と考え	とられ	る場	合は	、次山	回の 🤅	台寮	開始を	と延其	まする	ことが	があり	ます	。)			
			1日目	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		めやすの																											
薬の名前	<u>作用</u>	時間																											
ポララミン注 デキサート注	アレルギーを予防 する薬です	15分	9						9							9							9						
アービタックス注	抗がん剤です	120分				回目以降 毎時間が知			9																				
治療によ	る副作用			`	-1-11-170																			:注意	が必	要な問	寺期		
		1日目	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			1/0	1/1	1/2	1/3 1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27
			土	日	月	火水	木	金	土	田	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金
過敏症																													
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
自 口内炎 覚症																													
状┃ 色素沈清 ┃																													
		肌が	黒ずも	رعات	があります	。長衤	中帽	子なと	を用い	ハて、	日光	など紫ダ	外線に	こは注	È意し	てくだ	さい。												
+++	/++ +=																												
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)		にきて	ゾのよ	うな乳	≜疹ができ	たり、	皮膚が	が乾燥	してひ	いび割	れがつ	できるこ	ことが	あるの	ので、	保湿剤	引を使	うなと	じて	予防し	しまし。	よ う 。							



- *注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- *何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部

