



# 【FOLFIRI+サイラムザ療法について】

## (5-FU+レボホリナート+トポテシン+サイラムザ)





様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			アロキシ注 デキサート注 ボララミン注	吐き気止めです アレルギー予防も	15分	☺														☺													
サイラムザ注	抗がん剤です	60分	☺																														
トポテシン注	抗がん剤です	2時間	☺																														
レボホリナート注	5-FUの効果を 強める薬です		☺																														
5-FU注	抗がん剤です	約5分	☺																														
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	↔☺↔																														




### 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
自覚症状	食欲不振・吐き気																																	
	口内炎																																	
	下痢																																	
	色素沈着																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。