




【アバスチン+SOX療法について】

(S-1+エルプラット+アバスチン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
アロキシ注	吐き気止めです	15分																													
デキサート注																															
アバスチン注	抗がん剤です	90分																													
エルプラット注	抗がん剤です	2時間																													
S-1錠	抗がん剤です	朝・夕 内服																													

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目								
自覚症状	過敏症																														
	食欲不振・吐き気																														
	手足のしびれ																														
	口内炎																														
	下痢																														
	色素沈着																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														
	肝機能低下																														

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。