

【ベバシズマブ療法について】



様_	コース目

12

11

10

13

14

○ お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

0 0000	ит — применти	— (дін													• • •—				, • –					
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日
		めやすの																						
薬の名前	作用	時間																						
生理食塩水			P							(hr	S°	Ξσ.	· · · 過は				(hv	S ^o	ت ا	週は				Ģ
ベバシズマブ注	抗がん剤です	90分	Ŷ	$\overline{}$		目から投				Č.		おか	ᡮみです ───	r.)			- C		お休	みです	-)			9
	•	<u>'</u>			1 短くか	ることか	(ありまる	· -		•	•	•	•						•		•		•	

🙂 治療による副作用

		:注意:	が必要	な時期			
15	16	17	18	19	20	21	1日目
-							

過敏症 痒みや顔のほでり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。

血圧上昇

自宅での血圧測定を心がけてください。

1日目

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

6

- ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
 - ●血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



自覚症

状

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部