



【ドキシル+カルボプラチン+ベバシズマブ療法について】

様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 |
|-------------------|---------|---------|-----|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| イメンドカプセル | 吐き気止めです | 1日1回 内服 | | | | 1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前 に飲んでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトン注 デキサート注 | 吐き気止めです | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキシル注 | 抗がん剤です | 90分 | | 尿の色が赤くなることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 | 抗がん剤です | 1時間 | | この週は お休みです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベバシズマブ注 | 抗がん剤です | 90分 | | 2回目から投与時間が 短くなります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

☺ **治療による副作用** :注意が必要な時期

| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 |
|------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚症状 | アレルギー様症状 | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手足症候群 | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肝機能低下 | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

- 出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。