



【ゲムシタピン療法について】




様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			デキサート注	吐き気止めです	15分	💧							💧							💧												
ゲムシタピン注	抗がん剤です	30分	💧							💧							💧															💧



😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	発熱																														
	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																														
	食欲不振・吐き気																														
食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																															
検査値	血管痛・静脈炎																														
	点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																														
	白血球減少																														
感染しやすくなりますので、手洗いうがいをおこなってください。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																															
赤血球減少(貧血)																															
貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																															
血小板減少																															
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																															
肝機能低下																															
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるすることがあります。																															



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。