



【ドキシソルビシン+ネダプラチン療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
デキサート注 フブニセドロン注	吐き気止めです	15~30分	☺																																		☺
ドキシソルビシン注	抗がん剤です	90分	☺																																		☺
ネダプラチン注	抗がん剤です	1時間	☺																																		☺

尿の色が赤くなる場合があります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目							
自覚症状	アレルギー様症状																																				
	食欲不振・吐き気																																				
	口内炎																																				
	手足症候群																																				
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																				
検査値	白血球減少																																				
	赤血球減少(貧血)																																				
	血小板減少																																				
	肝機能低下																																				

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。