



【アービタックス療法について】



様

 コーシ

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前 作用 めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボラミン注 デキサート注	アレルギーを 防 する薬です	15分																												
アービタックス注	抗がん剤です	120分																												

2回目以降は点滴時間が短くな

治療による副作用



 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
自覚 症状	過敏症	 							 							 							 							痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。
	口内炎		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。	
	色素沈着															 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。	
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)									 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

目

1日目



1日目

部