



# 【A+CHP療法について】

(アドセトリス+ドキシソビシン+エンドキサン+プレドニゾン)



様  コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目	
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
グラニセトン注	吐き気止めです	15分																					
アドセトリス注	抗がん剤です	30分																					
ドキシソビシン注	抗がん剤です	数分																					
エンドキサン注	抗がん剤です	30分																					
プレドニゾン錠	抗がん剤です	30分																					

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。

## 😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目		
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	しびれ																						
	便秘																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	肝機能低下																						

● 皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状がありましたらお知らせ下さい。) ● 心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。