



【IsaKd療法について】

(サークリサ+カイトロリス+デキサート)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
カロナール錠	アレルギー予防	1日1回 内服																																	
ファモチジン注 ポララミン注	アレルギー予防	30分																																	
デキサート注	ステロイドです																																		
デカドロン錠	ステロイドです	1日1回 内服																																	
サークリサ注	抗がん剤です	3-4時間																																	
カイトロリス注	抗がん剤です	30分																																	

\*サークリサは2コース目以降、2週間毎の投与になります。  
\*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目						
自覚症状	アレルギー様症状																																			
	食欲不振・吐き気																																			
	下痢																																			
	倦怠感																																			
検査値	白血球減少																																			
	赤血球減少(貧血)																																			
	血小板減少																																			
	腎機能低下																																			
	肝機能低下																																			

以下の副作用は、気づいたことがあればお知らせください。

- 心障害(動悸・脈の乱れ・息切れ・胸の痛みなど)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。