



# 【R-CHOP療法について】 (リツキサン+エンドキサン+ドキシソルピシン+オンコビン+プレドニン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用																								
レスタミン錠 カロナール錠	アレルギー予防	1日1回 内服	○																						○
リツキサン注	抗がん剤です	3~5時間	📌																						📌
グラニセトロン注	吐き気止めです	30分	📌																						📌
ドキシソルピシン注	抗がん剤です	数分	📌																						📌
オンコビン注	抗がん剤です	数分	📌																						📌
エンドキサン注	抗がん剤です	30分	📌																						📌
プレドニン錠	ステロイドです	朝・昼 内服	📌	📌	📌	📌	📌	📌																	📌

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	アレルギー様症状																								
	食欲不振・吐き気																								
	不眠																								
	胃部不快感																								
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																								
	口内炎																								
	便秘																								
	発熱																								
	手足のしびれ																								
検査値	白血球減少																								
	赤血球減少(貧血)																								
	血小板減少																								

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。