



【カルボプラチン+パクリタキセル療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用		めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目			
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回																												
グラニセトン注	吐き気止めです	30分		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> デキサート注には、吐き気止めとしての作用もあります。 </div>																										
デキサート注	過敏症を抑える薬です																													
ガスター注																														
ポララミン注																														
パクリタキセル注	抗がん剤です	3時間																												
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間																												

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目						
自覚症状	過敏症																												
	食欲不振・吐き気																												
	筋肉痛・関節痛																												
	口内炎																												
	手足のしびれ																												
	便秘																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																												
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												
	肝機能低下																												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。



* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。