



【シスプラチン+ビルルビン(ロゼウス)療法について】




様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用		めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	...	28	1日目
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																									
パロノセトロン注	吐き気止めです	30分																									
デキササート注																											
ビルルビン(ロゼウス)	抗がん剤です	5分																									
シスプラチン注	抗がん剤です	1時間																									



★治療日は、点滴開始～シスプラチン投与終了までに1000mL以上の水分をとりましょう。
治療翌日、翌々日は食事など通常の摂取量に加えて、1日あたり1000mL程度の水分を追加摂取しましょう。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	...	21	1日目				
自覚症状	食欲不振・吐き気																										
	血管痛・静脈炎																										
	便秘																										
	口内炎																										
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																										
	手足のしびれ																										
検査値	白血球減少																										
	赤血球減少(貧血)																										
	血小板減少																										
	腎機能低下																										



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。