



【オプジーボ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法について】




様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
パンビタン	葉酸を含む総合ビタミンです	1日1回	内服																								
イメドカプセル	吐き気止めです	朝	内服																								
グラニセトン注 デキサート注	吐き気止めです	30分																									
オプジーボ注	抗がん剤です	30分																									
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分																									
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間																									
※ ペメトレキセド注による副作用軽減のため、パンビタン末(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。																											



😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目			
自覚症状	食欲不振・吐き気																									
	皮疹																									
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																									
	手足のしびれ																									
検査値	白血球減少																									
	赤血球減少(貧血)																									
	血小板減少																									
	腎機能低下																									
	肝機能低下																									

*オプジーボの副作用については別紙を用いて説明します。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

