



【FOLFIRINOX療法について】

(5-FU+レボホリナート+トポテシ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回																																			
アロキシ注	吐き気止めです	15分																																			
デキサート注																																					
エルプラット注	抗がん剤です	2時間																																			
トポテシ注	抗がん剤です	2時間																																			
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です	2時間																																			
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間																																			

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目								
自覚症状	過敏症																																					
	食欲不振・吐き気																																					
	口内炎																																					
	下痢																																					
	手足のしびれ																																					
	色素沈着																																					
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																					
検査値	白血球減少																																					
	赤血球減少(貧血)																																					
	血小板減少																																					



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

