



【シスプラチン+イリノテカン療法について】



様

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
薬の名前	作用	めやすの時間																															
デキサート注			💧														💧															💧	
アロキシ注			💧														💧															💧	
イリノテカン注	抗がん剤です	90分	💧														💧														💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧														💧														💧		



治療による副作用

 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	下痢																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	腎機能低下																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

|