



【サイラムザ+パクリタキセル療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			ポラミン注	過敏症を抑えるお薬です	30分	☺							☺							☺													
デキサート注																																	
サイラムザ注	抗がん剤です	60分	☺														☺																☺
パクリタキセル注	抗がん剤です	60分	☺														☺																☺

😊 治療による副作用

☑ : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
自覚症状	アレルギー様症状	☑							☑							☑																	☑
	食欲不振・吐き気	☑							☑								☑																☑
	関節痛・筋肉痛	☑							☑								☑																☑
	手足のしびれ	☑							☑								☑																☑
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	☑							☑								☑																☑
検査値	白血球減少	☑							☑							☑																☑	
	赤血球減少(貧血)	☑							☑							☑																☑	
	血小板減少	☑							☑							☑																☑	
	肝機能低下	☑							☑							☑																☑	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。