



**【S-1・CDDP療法について】**  
(S-1+シスプラチン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1日目		
S-1	抗がん剤です	朝・夕 内服	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪	☪																☪	
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服								☪	☪																													
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分								☪																														
デカロン錠	吐き気止めです	朝 内服								☪																														
シスプラチン注	抗がん剤です	1時間								☪																														

抗がん剤の投与開始

この週はお休みです。

この週はお休みです。

1回2錠

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1日目			
自覚症状	食欲不振・吐き気																																							
	皮疹																																							
	下痢																																							
	口内炎																																							
	色素沈着																																							
	手足のしびれ																																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																							
検査値	白血球減少																																							
	赤血球減少(貧血)																																							
	血小板減少																																							
	腎機能低下																																							
	肝機能低下																																							



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。